

急性 単純性（漿液性）/化膿性 歯髄炎/根尖性歯周炎のまとめ

	歯髄炎	根尖性歯周炎
単 純 性	<p>急性単純性歯髄炎</p> <p>症状：牽引性の痛み 間欠的な自発痛</p> <p>誘発：冷刺激、甘味、酸味、食片圧入で持続性誘発痛</p> <p>検査：歯髄診の閾値低下 歯髄診+ 打診痛-</p>	<p>急性単純性根尖性歯周炎</p> <p>症状：自発痛は比較的軽度 歯の挺出感</p> <p>誘発：咬合痛、根尖部圧痛</p> <p>検査：打診痛+ 根尖部透過像± 歯髄診-</p>
化 膿 性	<p>急性化膿性歯髄炎</p> <p>症状：拍動性、放散性、穿刺性、電撃性の自発痛 激痛のため関連痛（耳部、側頭部、上顎洞） 痛みの定位が悪い</p> <p>誘発：血行が良くなる時に増悪（夜間、入浴時） 温熱刺激で持続時間の長い誘発痛 → 冷刺激で緩和</p> <p>検査：末期では歯髄診の閾値が上昇（歯髄診+）</p> <p>※ 全部性では挺出感+、打診痛+</p>	<p>急性化膿性根尖性歯周炎</p> <p>症状：初期は鈍い自発痛 歯の挺出感（歯根膜期～） 拍動性の自発痛（骨内期～） 歯の動揺（骨内期/骨膜下期～） 所属リンパ節腫脹、発熱 倦怠感（骨内期/骨膜下期～） 歯肉膿瘍、顔面膿瘍、蜂窩織炎（粘膜下期） 根尖相当歯肉の発赤、腫脹</p> <p>誘発：温熱刺激で増強（骨内期） → 冷刺激で緩和</p> <p>検査：打診痛+ 根尖部透過像+ 波動を触知（粘膜下期） 歯髄診- 患歯の特定が容易</p>